

## Правила, яких слід дотримуватися батькам або особам, які їх замінюють

Кожного ранку перед приходом до школи виконувати замір температури і перевіряти наявність респіраторних симптомів:

- » Наявність температури вище 36,6 чи поява респіраторних симптомів.
- » Наявність зв'язку з груповим спалахом захворювання на території країни або наявність недавнього візиту закордон.



Якщо дитина знаходиться на домашній ізоляції, батьки повинні навчити її дотримуватися таких профілактичних заходів:

- Залишатися вдома.
- Жити окремо в ізольованому просторі, якщо це можливо.
- Часто провітрювати приміщення.
- Приймайти їжу наодинці.

**Якщо учень знаходиться на домашній ізоляції, батькам необхідно дотримуватися таких профілактичних заходів:**

- » Під час перебування на ізоляції щодня ретельно перевіряти стан здоров'я на наявність високої температури чи респіраторних симптомів.
- » Під час періоду ізоляції члени сім'ї або співмешканці повинні максимально уникати контакту з хворим учнем/студентом:
  - забороняється контактувати з літніми людьми, вагітними, малими дітьми, людям з хронічними захворюваннями або онкологією.
  - забороняється прийом гостей.
- » Жити в окремому приміщенні з дитиною на ізоляції і часто провітрювати його кімнату.
- » Використовувати різні особисті предмети (рушники, посуд тощо) при користуванні спільним туалетом або душовою кабіною, дезінфікувати їх (наприклад, домашнім розчином хлорної рідини).

### Дотримуватися правил особистої гігієни



Ретельно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком:

- перед вживанням їжі;
- після кожного відвідування вбиральні;
- після повернення з вулиці.



Дотримуватися етикету кашлю:

- необхідно прикрити обличчя рукавом одягу або одноразовою паперовою серветкою;
- після використання серветки необхідно викинути її у смітник;
- ретельно вмити руки з милом протягом 30 секунд.

### У яких випадках необхідно повідомити класного керівника/вихователя/майстра виробничого навчання і не відвідувати заняття?

Наявність температури вище 36.6 або поява респіраторних симптомів.



Наявність зв'язку з груповим сплахом захворювання на території країни або недавній візит за кордон.



Якщо Ви припинили відвідувати заняття у закладі освіти, необхідно дотримуватися таких профілактичних заходів:



Залишатися вдома.  
Жити самому в ізольовано просторі, якщо це можливо.



Часто провітрювати приміщення.



Приймати їжу наодинці.